

วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ชนิด 2 สายพันธุ์ (CERVARIX)

โรคมะเร็งปากมดลูก คืออะไร?

โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งติดต่อได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เชื้อ HPV มีหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 เป็นสาเหตุหลักของโรคถึง 66%

การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามช่วงอายุอย่างสม่ำเสมอ
- ลดความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัย และมีคู่นอนคนเดียว
- ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในช่วงอายุที่เหมาะสมและครบตามจำนวนเข็ม

วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 2 สายพันธุ์ (CERVARIX)

เป็นวัคซีนที่ป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในการก่อมะเร็งปากมดลูก

ประสิทธิภาพของวัคซีน

- มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 66%

ช่วงอายุที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน

- หญิงทั่วไปอายุ 9–26 ปี
- หญิงอายุ >27 ปี ที่มีความเสี่ยงสูง โดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

คำแนะนำในการฉีดวัคซีน CERVARIX

- อายุ 9–15 ปี: ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6–12 เดือน
- ตั้งแต่อายุ 15–45 ปี: ฉีด 3 เข็ม ภายใน 6 เดือน (เข็มที่ 2 หลังจากเข็มแรก 1–2 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน)
- ควรฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ไม่จำเป็นต้องตรวจ Pap Smear หรือ HPV ก่อนฉีดวัคซีน
- หากเคยมีเพศสัมพันธ์หรือเคยติดเชื้อ HPV ก็ยังสามารถฉีดวัคซีนได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำหรือติดเชื้อสายพันธุ์อื่น
 - ในกรณีที่เคยติดเชื้อ Covid ควรรอให้หายดี และ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 อาทิตย์ จึงมาเข้ารับคำปรึกษาการฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

อาการทั่วไป (หายได้เองภายใน 2–3 วัน):

- ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
- มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย คลื่นไส้

อาการรุนแรง (พบได้น้อยมาก):

- อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis): หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ หน้าบวม ความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็ว → ควรรีบพบแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม

- ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน
- ผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรรอให้อาการดีขึ้นก่อนฉีด
- หญิงตั้งครรภ์: หากเริ่มฉีดแล้วตั้งครรภ์ ควรหยุดรับวัคซีนที่เหลือไว้และกลับมารับภายหลังคลอด

ข้อมูลวัคซีนที่มีจำหน่าย

- วัคซีน CERVARIX (ชนิด 2 สายพันธุ์)
- ราคา 1,700 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว)