

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิด 4 สายพันธุ์ **(QDENGGA)**

โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) คือ

เกิดจากการติดเชื้อ Dengue Virus ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ย่อย (DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4) โดยมี 'ยุงลาย' เป็นพาหะนำโรค ฤดูระบาดของในประเทศไทยมักอยู่ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะรุนแรงของโรคได้เช่นกัน

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

- ป้องกันยุงกัด เช่น สวมเสื้อแขนยาว ใช้มุ้งนอน
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะที่มีน้ำขัง
- ฉีดวัคซีนเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดการนอนโรงพยาบาล และลดโอกาสเกิดโรครุนแรง

วัคซีน QDENGGA คืออะไร

เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated vaccine) ที่ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ของไวรัสเดงกี สามารถฉีดได้โดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันล่วงหน้า

ประสิทธิภาพของวัคซีน QDENGGA

- ป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการได้ 80.2%
- ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกได้ 90.4%

ช่วงอายุที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน QDENGGA

- สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 4–60 ปี

คำแนะนำในการฉีดวัคซีน QDENG A

- ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
- ผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออก ควรเว้นระยะอย่างน้อย 6 เดือนหลังหายจากโรค ก่อนมารับวัคซีน
- กรณีเตรียมเดินทาง ควรได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 14 วันก่อนออกเดินทาง และฉีดครบทั้ง 2 เข็ม

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

อาการทั่วไป (หายได้เองภายใน 2–3 วัน):

- ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
- มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย

อาการรุนแรง (พบได้น้อยมาก):

- อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis): หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ หน้าบวม ความดันต่ำ → ควรรีบพบแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง/ห้ามฉีดวัคซีน QDENG A

- แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน
- มีภูมิคุ้มกันต่ำ
- หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- เคยได้รับวัคซีนเชื่อเป็นอณูฤทธิ์อื่น เช่น อีสุกอีใส หัด หัดเยอรมัน คางทูม หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดภายใน 1 เดือนก่อนหน้า
- ในกรณีที่เคยติดเชื้อ Covid ควรรอให้หายดี และ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 อาทิตย์ จึงมาเข้ารับคำปรึกษาการฉีดวัคซีน

ข้อมูลวัคซีน QDENGGA ที่มีจำหน่าย

- วัคซีน QDENGGA (ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์)
- ราคา 2,200 บาท/ครั้ง (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)